

Confusion

Questions de l'équipe soignante

Quand la confusion a-t-elle commencé? Est-elle apparue soudainement?

Augmente-t-elle graduellement depuis quelques jours?

A-t-elle commencé le matin, le soir, à l'heure du coucher?

La personne a-t-elle déjà eu d'autres épisodes de confusion, par exemple après une opération?

La personne a-t-elle des antécédents de démence?

Quelle est l'intensité de la confusion? Légère, modérée ou grave?

Il peut être utile de noter la confusion sur une échelle de 0 à 10. Zéro signifie « pas de confusion » alors que 10 correspond à une confusion extrême.

Comment la personne se comporte-t-elle lorsqu'elle est confuse? Pince-t-elle l'air ou les draps de son lit?

Parle-t-elle fort, crie-t-elle ou donne-t-elle des coups? A-t-elle un discours qui paraît insensé?

Sembler-t-elle effrayée ou bouleversée? La personne est-elle la seule à voir, ressentir ou entendre certaines choses?

Qu'est-ce qui aggrave la confusion? Qu'est-ce qui l'atténue?

Quels médicaments la personne prend-elle actuellement? Quand les prend-elle?

Depuis combien de temps?

Causent-ils des effets secondaires?

La confusion de la personne compromet-elle sa propre sécurité?

Compromet-elle la sécurité d'autres personnes au centre de soins?

Quels sont vos buts et vos attentes en matière de soins? La personne a-t-elle préparé des directives anticipées en matière de soins de santé?

Souhaite-t-elle passer des tests et recevoir des traitements pour des problèmes possiblement traitables?